

予 防 接 種




就学前の定期予防接種一覧表

令和7年3月現在

種 別	接 種 方 法		
	対 象 年 齢	回 数	備 考 ・ 間 隔
ロタウイルス ワクチン	生後6週～24週 (初回接種は生後14週6日まで)	2回	ロタリックス(1価)を接種する場合 4週以上の間隔をあけて2回経口接種
	生後6週～32週 (初回接種は生後14週6日まで)	3回	ロタテック(5価)を接種する場合 4週以上の間隔をあけて3回経口接種
ヒブワクチン ※5種混合の場合は 不要	(接種開始月齢) 生後2か月～ 7か月未満	4回	初回免疫として4～8週間隔で3回接種後、 追加免疫として3回目の接種後7～13か月の 間に1回接種の計4回 ※3回目の接種は、1歳未満に完了すること
	(接種開始月齢) 生後7か月～ 1歳未満	3回	初回免疫として4～8週間隔で2回接種後、 追加免疫として2回目の接種後7～13か月の 間に1回接種の計3回 ※2回目の接種は、1歳未満に完了すること
	(接種開始月齢) 1歳～5歳未満	1回	1回のみ接種
小児用肺炎球菌	(接種開始月齢) 生後2か月～ 7か月未満	4回	初回免疫として4週間以上あけて3回接種 後、追加免疫として60日以上あけてかつ生 後12か月以降に1回接種の計4回 ※2回目の接種は1歳までに、3回目の接種 は、2歳未満に完了すること
	(接種開始月齢) 生後7か月～ 1歳未満	3回	初回免疫として4週間以上あけて2回接種 後、追加免疫として60日以上あけてかつ生 後12か月以降に1回接種の計3回 ※2回目の接種は、2歳未満に完了すること
	(接種開始月齢) 1歳～2歳未満	2回	60日以上の間隔をあけて2回接種
	(接種開始月齢) 2歳～5歳未満	1回	1回のみ接種
B型肝炎	1歳未満	3回	4週間の間隔をおいて2回接種後、1 回目の接種から20週以上の間隔をあ けて3回目を接種

種 別	接 種 方 法		
	対 象 年 齢	回 数	備 考 ・ 間 隔
5種混合 (ジフテリア 百日せき 破傷風 ポリオ ヒブ)	第1期 生後2か月～7歳6 か月未満	初回 3回	3～8週あけて3回 初回接種(3回目)終了後6か月 ～1年半あけて1回
		追加 1回	
4種混合 ※5種混合の場合は 不要	第1期 生後2か月～7歳6 か月未満	初回 3回	3～8週あけて3回 初回接種(3回目)終了後1年～ 1年半あけて1回
		追加 1回	
B C G	生後1歳未満	追加 1回	第1期初回3回目の接種終了後 1年～1年半までの間に接種
麻しん・風しん混合	第1期1歳～2歳未満	1回	
	第2期小学校に入学 する前年の4月1日か ら入学する年の3月 31日までの1年間	1回	
水痘 (水ぼうそう)	1歳～3歳未満	2回	6～12か月あけての計2回。
日本脳炎	第1期 生後6か月～7歳6 か月未満 ※標準的接種は3歳開始	初回 2回	1～4週間あけて2回接種 第1期初回接種終了後おおむね1 年後に接種
		追加 1回	

定期予防接種は、八尾市内の委託医療機関で実施しています。
入院や里帰り等の事情により、八尾市外で予防接種を希望する場合は、保健センターで
事前の手続きが必要となります。
また、八尾市ホームページから電子申請もできます ⇒ 
接種予定日の2週間前までに申請してください。

任意接種(接種費用は、保護者負担となります。)

○予防接種については、法改正により変更になることがあります。
詳細は、広報や八尾市ホームページでお知らせします。

種 別	接 種 方 法		
	対 象 年 齢	回 数	備 考 ・ 間 隔
おたふくかぜ	生後12か月以降	2回 (推奨)	1歳で1回 小学校入学前1年間で1回
インフルエンザ (13歳未満)	生後6か月以降	毎年 2回	2～4週間隔